

貯法：気密容器
遮光して、火気を避けて
室温保存
注意：「取扱い上の注意」
の項参照

ハイポエタノール液2%ケンエイ

チオ硫酸ナトリウム 2w/v% エタノール液

HYPO ETHANOL SOLUTION 2% 「KENEI」

承認番号	22000AMX02329
薬価収載	2008年12月
販売開始	2009年1月

【禁忌（次の部位には使用しないこと）】

損傷皮膚及び粘膜 [損傷皮膚及び粘膜への使用により、刺激作用を有する。]

【組成・性状】

100 mL中 日局チオ硫酸ナトリウム水和物 2g含有。
添加物としてエタノール、炭酸水素ナトリウムを含有する。
エタノール（日局エタノール 66.8 vol%）を含有する無色澄明の液で、特異なおいがある。

【効能・効果】

皮膚面及び手術用器具類、布類に付着したヨードチンキ類のヨウ素の脱色作用と同時に、消毒効果がある。

【用法・用量】

殺菌消毒剤ヨードチンキ・希ヨードチンキの塗布による皮膚面（手術部位及び手術者の皮膚）及び手術用器具類・布類に付着したヨウ素の脱色ならびに消毒剤として塗布又は、洗滌などに、そのまま使用する。

【使用上の注意】**1. 重要な基本的注意**

- (1) 眼に入らないように注意すること。
眼に入った場合には水でよく洗い流すこと。
- (2) 広範囲又は長期間使用する場合には、蒸気の吸入に注意すること。

2. 副作用

本剤は使用成績調査等の副作用発現頻度が明確となる調査を実施していない。

- (1) **過敏症**：発疹等の過敏症状（頻度不明）があらわれることがあるので、このような場合には使用を中止し、適切な処置を行うこと。
- (2) **皮膚**：刺激症状（頻度不明）があらわれることがあるので、このような症状があらわれた場合には使用を中止すること。

3. 適用上の注意**(1) 人体**

- 1) **投与経路**：外用にのみ使用すること。
- 2) **使用時**：同一部位（皮膚面）に反復使用した場合には、脱脂等による皮膚荒れを起すことがあるので、注意すること。

(2) その他

- 1) **使用時**：血清、膿汁等の蛋白質を凝固させ、内部にまで浸透しないことがあるので、これらが付着している医療器具等に用いる場合には、十分に洗い落してから使用すること。
- 2) **器具等材質**：合成ゴム製品、合成樹脂製品、光学器具、鏡器具、塗装カテーテル等には、変質するものがあるので注意すること。

【取扱い上の注意】

〈注意〉

- (1) 結晶が析出した場合には少し加温し溶解すること。
- (2) 引火性、爆発性があるため、火気（電気メス使用等も含む）には十分注意すること。

【包装】

500mL