

貯法	直射日光を避けて、 室温保存
使用期限	瓶に最終年月表示

外用消毒剤

承認番号	22000AMX01501000
薬価収載	2008年6月
販売開始	2008年7月

# イソジン<sup>®</sup>液10%

## ISODINE<sup>®</sup> SOLUTION 10%

**禁忌**（次の患者には使用しないこと）  
本剤又はヨウ素に対し過敏症の既往歴のある患者

### 【組成・性状】

#### (1)組成

イソジン液10%は、1 mL中に下記の成分を含有する。

有効成分	ポビドンヨード	100mg（有効ヨウ素として10mg）
添加物	濃グリセリン、クエン酸水和物、無水リン酸一水素ナトリウム、ラウロマクロゴール、pH調整剤	

#### (2)製剤の性状

イソジン液10%は、界面活性剤を含有する黒褐色の液剤で、特異なおいがある。本剤は無菌製剤である（開栓までの無菌を保証）。

### 【効能・効果】

手術部位（手術野）の皮膚の消毒、手術部位（手術野）の粘膜の消毒、皮膚・粘膜の創傷部位の消毒、熱傷皮膚面の消毒、感染皮膚面の消毒

### 【用法・用量】

- (1)手術部位（手術野）の皮膚の消毒、手術部位（手術野）の粘膜の消毒  
本剤を塗布する。
- (2)皮膚・粘膜の創傷部位の消毒、熱傷皮膚面の消毒、感染皮膚面の消毒  
本剤を患部に塗布する。

### 【使用上の注意】

#### (1)慎重投与（次の患者には慎重に使用すること）

- 1)甲状腺機能に異常のある患者〔血中ヨウ素の調節ができず甲状腺ホルモン関連物質に影響を与えるおそれがある。〕
- 2)重症の熱傷患者〔ヨウ素の吸収により、血中ヨウ素値が上昇することがある。〕

#### (2)副作用

総症例2,377例中副作用発現は4例0.17%であり、その内容は痒疹2例、灼熱感1例、発疹1例であった。（再評価結果）

##### 1)重大な副作用

**ショック、アナフィラキシー様症状**（呼吸困難、不快感、浮腫、潮紅、蕁麻疹等）（0.1%未満）があらわれることがあるので、観察を十分に行い、異常が認められた場合には、直ちに使用を中止し、適切な処置を行うこと。

#### 2)その他の副作用

種類\頻度	0.1%未満
過敏症 <sup>注)</sup>	発疹等
皮膚	接触皮膚炎、痒疹感、灼熱感、皮膚潰瘍、皮膚変色
甲状腺	血中甲状腺ホルモン値（T <sub>3</sub> 、T <sub>4</sub> 値等）の上昇あるいは低下などの甲状腺機能異常

注) 症状があらわれた場合には、使用を中止すること。

#### (3)妊婦、産婦、授乳婦等への投与

妊娠中及び授乳中の婦人には、長期にわたる広範囲の使用を避けること<sup>1)</sup>。

#### (4)臨床検査結果に及ぼす影響

酸化反応を利用した潜血試験において、本剤が検体に混入すると偽陽性を示すことがある<sup>2)</sup>。

#### (5)適用上の注意

##### 1)使用部位

経口投与しないこと。

##### 2)使用時

- ①大量かつ長時間の接触によって接触皮膚炎、皮膚変色があらわれることがあるので、溶液の状態で長時間皮膚と接触させないこと<sup>3)</sup>。（本剤が手術時に体の下にたまった状態や、ガーゼ・シート等にしみ込み湿った状態で、長時間皮膚と接触しないよう消毒後は拭き取るか乾燥させるなど注意すること。）
- ②眼に入らないように注意すること。入った場合には、水でよく洗い流すこと。
- ③深い創傷に使用する場合は希釈液としては生理食塩液か注射用水を用い、水道水や精製水を用いないこと。
- ④石けん類は本剤の殺菌作用を弱めるので、石けん分を洗い落としてから使用すること。
- ⑤電気的な絶縁性をもっているため、電気メスを使用する場合には、本剤が対極板と皮膚の間に入らないよう注意すること。

#### (6)その他の注意

- 1)本剤を新生児に使用し、一過性の甲状腺機能低下を起こしたとの報告がある<sup>4)</sup>。
- 2)ポビドンヨード製剤を腔内に使用し、血中総ヨウ素値及び血中無機ヨウ素値が一過性に上昇したとの報告がある<sup>5)</sup>。
- 3)本剤を妊婦の腔内に長期間使用し、新生児に一過性の甲状腺機能低下があらわれたとの報告がある<sup>6)</sup>。
- 4)ポビドンヨード製剤を腔内に使用し、乳汁中の総ヨウ素値が一過性に上昇したとの報告がある<sup>7)</sup>。

### 【臨床成績】

臨床効果の有効率は1,142例中1,101例96.4%を示し、その内容は手術部位（手術野）では966例中935例96.8%、創傷部位・熱傷皮膚面では64例中63例98.4%、感染皮膚面では112例中103例92.0%であった。（再評価結果）

【薬効薬理】

(1)細菌等に対する効果 (in vitro)

1) イソジン液が細菌等を殺菌するのに要する最小時間は次のとおりであった<sup>8)</sup>。

被 験 菌	殺菌時間
<i>Staphylococcus aureus</i> ATCC 6538P	60秒以内
<i>Staphylococcus aureus</i> R-No. 26	30 〃
<i>Staphylococcus epidermidis</i> ATCC 12228	30 〃
<i>Streptococcus pyogenes</i>	30 〃
<i>Corynebacterium diphtheriae</i>	30 〃
<i>Escherichia coli</i> NIHJ	30 〃
<i>Salmonella paratyphi</i> A	30 〃
<i>Salmonella paratyphi</i> B	30 〃
<i>Shigella sonnei</i>	30 〃
<i>Proteus vulgaris</i> OX-19	30 〃
<i>Pseudomonas aeruginosa</i> IAM 1007	30 〃
<i>Candida albicans</i>	30 〃

2) イソジン液の臨床分離株に対する効果は次のとおりであった<sup>9-11)</sup>。

被 験 菌	株数	イソジン液の希釈倍率 (PVP-I濃度)	作用時間	減菌率
<i>Staphylococcus aureus</i> (MSSA)	20	20倍 (0.5%)	30秒	99.99%以上
<i>Staphylococcus aureus</i> (MRSA)	20	20倍 (0.5%)	30秒	99.99%以上
<i>Escherichia coli</i>	10	20倍 (0.5%)	30秒	99.99%以上
<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	20	20倍 (0.5%)	30秒	99.99%以上
<i>Serratia marcescens</i>	20	20倍 (0.5%)	30秒	99.99%以上
<i>Burkholderia cepacia</i>	10	20倍 (0.5%)	30秒	99.99%以上
<i>Klebsiella pneumoniae</i>	10	20倍 (0.5%)	30秒	99.99%以上
<i>Mycobacterium avium</i>	2	100倍 (0.1%)	30秒	99.9%以上
<i>Mycobacterium kansasii</i>	3	100倍 (0.1%)	30秒	99.9%以上
<i>Mycobacterium tuberculosis</i>	7	100倍 (0.1%)	30秒	99.99%以上

(2)ウイルスに対する効果 (in vitro)

イソジン液のウイルスに対する効果は次のとおりであった<sup>12-15)</sup>。

ウイルス	イソジン液の希釈倍率 (PVP-I濃度)	作用時間	ウイルス不活化率
単純ヘルペスウイルス	10倍 (1.0%)	30秒	99.99%以上
アデノウイルス	10倍 (1.0%)	30秒	99.9%以上
風疹ウイルス	10倍 (1.0%)	60秒	99.99%以上
麻疹ウイルス	10倍 (1.0%)	60秒	99.9%以上
ムンプスウイルス	10倍 (1.0%)	60秒	99.99%以上
インフルエンザウイルス	10倍 (1.0%)	30秒	99.99%以上
ロタウイルス (サル)	10倍 (1.0%)	30秒	99.9%以上
ポリオウイルス	2倍 (5.0%)	30秒	99.9%以上
HIV	10倍 (1.0%)	30秒	99.9%以上
サイトメガロウイルス	10倍 (1.0%)	30秒	99.9%以上
SARSウイルス	10倍 (1.0%)	60秒	99.99%以上
鳥インフルエンザウイルス (高病原性)	5倍 (2.0%)	10秒	99.99%以上
鳥インフルエンザウイルス (低病原性)	5倍 (2.0%)	10秒	99.99%以上
カリシウイルス (ネコ、イヌ)	40倍 (0.25%)	10秒	99.9%以上

また、コクサッキーウイルス、エコーウイルス、エンテロウイルスに対しても効果が認められた<sup>16,17)</sup>。

【有効成分に関する理化学的知見】

性 状：ポビドンヨードは暗赤褐色の粉末で、わずかに特異なおいがある。

本品は水又はエタノール (99.5) に溶けやすい。


本品1.0gを水100mLに溶かした液のpHは1.5～3.5である。

一般名：ポビドンヨード Povidone-Iodine

化学名：Poly [(2-oxopyrrolidin-1-yl) ethylene] iodine

分子式：(C<sub>6</sub>H<sub>9</sub>NO)<sub>n</sub>·xI

構造式：



【取扱い上の注意】

(1)本剤は外用消毒剤であるので、経口投与、吸入、注射、眼及び体腔内 (腹腔内、胸腔内等) に使用しないこと。

(2)衣類に付いた場合は水で容易に洗い落とせる。また、チオ硫酸ナトリウム溶液で脱色できる。

【包 装】

250mL

【主要文献】

- 1) Danziger, Y., *et al.* : Arch. Dis. Child., 62 : 295, 1987
- 2) Bar-Or, D., *et al.* : Lancet, 2 (8246) : 589, 1981
- 3) Okano, M., : J. Am. Acad. Derm., 20 (5) : 860, 1989
- 4) 竹内 敏ほか：日本小児外科学会雑誌, 30 (4) : 749, 1994
- 5) 小室順義ほか：産科と婦人科, 52 (10) : 1696, 1985
- 6) 大塚春美ほか：第30回日本新生児学会総会学術集会プログラム : 328, 1994
- 7) 北村 隆ほか：Progress in Medicine, 7 (5) : 1031, 1987
- 8) イソジン製剤の殺菌力試験 (社内資料)
- 9) 国定孝夫ほか：環境感染, 14 (2) : 142, 1999
- 10) 国定孝夫ほか：環境感染, 15 (2) : 156, 2000
- 11) Rikimaru, T., *et al.* : Dermatology, 195 (Suppl. 2) : 104, 1997
- 12) 川名林治ほか：臨床とウイルス, 26 (5) : 371, 1998
- 13) Kariwa, H., *et al.* : Dermatology, 212 (Suppl. 1) : 119, 2006
- 14) Ito, H., *et al.* : Dermatology, 212 (Suppl. 1) : 115, 2006
- 15) 遠矢幸伸ほか：日本化学療法学会雑誌, 54 (3) : 260, 2006
- 16) 栗村 敬ほか：Biomedica, 2 (12) : 1223, 1987
- 17) 野田伸司ほか：岐衛研所報, 24 : 15, 1979

【文献請求先】\*

主要文献に記載の社内資料につきましても下記にご請求下さい。

Meiji Seika ファルマ株式会社 くすり相談室  
〒104-8002 東京都中央区京橋2-4-16

《製品情報問い合わせ先》

Meiji Seika ファルマ株式会社 くすり相談室 電話 (03) 3273-3539  
FAX (03) 3272-2438

\*製造販売元

Meiji Seika ファルマ株式会社

東京都中央区京橋 2 - 4 - 16

技術提携

ムンディファーマ B.V.